

بررسی ارزش تاکسونومیکی صفات مورفولوژیک در مقایسه با صفات میکرومورفولوژیک دانه گرده در تائید جایگاه تاکسونومیکی جنس *Polygonatum* در ایران

ندا فرجی

کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران، n_faraji91@yahoo.com

تاریخ دریافت: مهر ۱۳۹۶ تاریخ پذیرش: آذر ۱۳۹۶

Evaluation of taxonomic value of morphological traits compared to micro-morphological traits pollen grains in confirmation of taxonomic position *Polygonatum* genus in Iran

Neda Faraji

MS.c, Department of Biology, Agriculture college, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran,

n_faraji91@yahoo.com

*Corresponding author: Neda Faraji

Received: September 2017 Accepted: November 2017

Abstract

Polygonatum (Asparagaceae) genus of 60 species in the world. 3 species from this genus distributed in Iran, namely *P. glaberrimum* and *P. orientale* and *P. sewerzowii*. Taxonomic research on 3 species consist of morphology and micromorphology of pollen grain due to comparative with value characteristics. Present study demonstrates the high value characteristics of fine morphologies compared with morphological traits so that the possibility of creating boundaries more precise in the way it provides and the taxonomic position now in the genus *Polygonatum* confirmed.

Keywords: Morphological traits, Pollen grain, Taxonomic value, Taxonomic position

چکیده

جنس *Polygonatum* از تیره Asparagaceae دارای ۶۰ گونه در جهان است. ۳ گونه از این جنس با نام *P. glaberrimum* و *P. orientale* *P. sewerzowii* در ایران یافت می‌شود. مطالعات تاکسونومی صورت گرفته روی این سه گونه شامل بررسی صفات مورفولوژیک و بررسی میکرومورفولوژیک دانه گرده با هدف مقایسه دقیق ارزش صفات مذکور در ایجاد مرز بین گونه‌ای و تثیت جایگاه جنس *Polygonatum* انجام شد. نتایج مطالعات حاضر نشان دهنده ارزش بالای صفات ریز ریخت‌شناسی در مقایسه با صفات ریخت‌شناسی است به طوری که امکان ایجاد مرزهای دقیق تری را در سطح گونه‌ای فراهم می‌آورد و جایگاه تاکسونومیک حاضر را در جنس *Polygonatum* تائید می‌کند.

کلمات کلیدی: ارزش تاکسونومیکی، جایگاه تاکسونومیکی، دانه گرده، صفات مورفولوژیک

فرآیند پژوهش

نمونه های جمع آوری شده از عملیات صحراوی با استفاده از فلور ایرانیکا (Rechinger, 1990) و فلور ایران (Parsa, 1950) و ترکه (Davis, 1984) و چین (Chen, 2000) و رستنیهای ایران (مبین، ۱۳۶۴) و مقالات متعدد و کتابهای موجود که شناسایی شد. برای اطمینان بیشتر نمونه های هرباریومی از باغ گیاه شناسی آریا مهر و موسسه گیاهشناسی و هرباریوم مرکزی ایران با نمونه های جمع آوری شده توسط مولف، تطبیق شد (جدول ۱). در بررسی میکرومورفولوژی از صفاتی چون شکل دانه گرده و طول محور قطبی و استوایی و تزیینات اگزین، از میکروسکوب الکترونی SEM استفاده شد. دانه های گرده جمع آوری شده ابتدا روی پایه های آلومینیومی با کمک چسب مخصوص قرار داده شد و پس از خشک شدن و پوشش دادن با میکروسکوپ الکترونی نگاره (ساخت کشور هلند) Philips-xl مدل عکسبرداری شدند.

نتایج و بحث

الف: نتایج مطالعات ریخت‌شناسی جنس *Polygonatum*
P. glabrrimum ساقه ۵۰ سانتیمتر و گوشه دار و بدون کرک و دارای برگ های متناوب به طول ۸-۱۲ و عرض ۳/۵-۷ سانتیمتر و پهن تخم مرغی شکل است و در زیر برگ دارای کرک های کوچک است و دارای دمبرگ کوتاه و دمگل دارای ۲ گل است و نسبتاً ضخیم است و گلپوش ۲۰ میلیمتر طولش و به شکل کوزه ای لوله ای است و در قسمت میانی منقبض نشده است و دندانه گلپوش در راس بدون کرک و میله پرچم ۵ میلی متر طول دارد و بدون

مقدمه و کلیات

جنس *Polygonatum* متعلق به رده تک لپه ایها و راسته Asparagales و تیره Asparagaceae است که قبلاً در راسته Liliaceae و جنس بزرگ Dahlgren, 1985 (Dahlgren, 1985) به تیره Convallariaceae و طایفه Polygonateae وارد شده (Chase, 2000; Rudall, 2000) تعیین حدود گردیده است و تیره های Nolinaceae و Dracaenaceae را در بر می گیرد که بر اساس داده های توالی DNA و حضور فیتو میلان در دانه این جنس به تیره Ruscaceae وارد شده است. در آخرین بازیابی مولکولی از تک لپه ایهای گلبرگ دار این Asparagaceae و تیره Asparagales (Chase, 2009) و زیر تیره Nolinoideae وارد شده است. APG III Angiosperm Phylogeny Group ۲۰۰۹ (APG III Angiosperm Phylogeny Group 2009) این تیره دارای ۶۰ گونه در جهان است. این جنس در افغانستان در تیره Lilliaceae قرار گرفته است در فلور ایرانیکا و فلور ترکیه و فلور چین و فلور فلور ایرانیکا جنس *Polygonatum* دارای ۷ گونه است که ۳ گونه آن در ایران وجود دارد و هیچ گونه اندمیک از ایران گزارش نشده است. فرم رویشی علفی و چند ساله اند. از ویژگی های رویشی این گیاه دارای ریزوم بند بند مفصلدار و گوشته با آثاری از ساقه از بین رفته است که در سال های گذشته وجود داشته که به صورت حلقه مدور است، معمولاً خاکزی، به ندرت اپی فیت است و دارای ساقه افراشته یا انحنادار یا بعضی موارد بالارونده و پیچنده است و برگها منفرد ساقه ای، شبه انتهایی و جانی، متناوب متقابل یا فراهم و دارای دمبرگ کوتاه یا بسیار دمبرگ، بعضی اوقات پیچک دار در راس می باشد.

با اندازه متوسط و شیاردار (sulcate) از نوع تک شیاری است موقعیت شیار قطبی خلفی distsl polar است که عموماً تک شیار دارها monosulcate و شکل گرده بیضوی (Elliptical) است. از نظر تقارن دارای تقارن Bilatral یا تقارن دو طرفه است و از نظر قطبیت Hetropolar یا ناجور قطبی است و تزیینات اگزین از نوع Perforate سوراخ دار است ساختار اگزین در ۲ گونه *P. glaberrimum* و *P. sewerzowii* دارای *Fossula oriental* فاقد *Fossula* می باشد.

P. glaberrimum طول محور استوایی (E)، ۵۶/۷۰ μm و طول محور قطبی (P)، ۲۴/۲۸ μm نسبت طول محور قطبی به طول محور استوایی E/P ۰/۲۷ μm و هم چنین دارای ۰/۳۳ μm و اندازه منافذ ۰/۲۳ μm است که دارای شیارهای پهن و عمیقی است (شکل A2,A1).

P. orientale طول محور استوایی (E)، ۲۱/۴۶ μm و طول محور قطبی (P)، ۴۷/۵۹ μm نسبت طول محور قطبی به طول محور استوایی E/P ۰/۲۱ μm و اندازه منافذ ۰/۰/۲۳ μm و هم چنین دارای *Fossula* است که دارای شیارهای باریک و کم عمیقی است (شکل B2,B1).

P. sewerzowii طول محور استوایی (E)، ۲۴/۳۷ μm و طول محور قطبی (P)، ۵۴/۸۱ μm نسبت طول محور قطبی به طول محور استوایی E/P ۰/۲۴ μm و اندازه منافذ ۰/۰/۱۹ μm و هم چنین فاقد *Fossula* است (شکل C2,C1).

کرک و میوه سته ۱۲ میلی متر قطر دارد و سیاه آبی رنگ است.

P. orientale ساقه ۶-۱۴ سانتیمتر و گوشهدار و بدون عرض ۴-۵/۲ سانتیمتر و بیضوی تخم مرغی شکل است و در زیر برگ دارای کرکهای خشن است و دارای دمبرگ کوتاه و دمگل دارای ۱-۵ گل است و باریک است و گلپوش ۱۱ میلیمتر طولش و به شکل لوله‌ای است و در قسمت میانی منقبض شده است و دندانه گلپوش در راس کرکدار و میله پرچم ۷-۱۲ میلیمتر طول دارد و کرکدار و میوه سته ۱/۵ میلیمتر قطر دارد و ابی سیر رنگ است.

P. sewerzowii: ساقه ۹۰ سانتیمتر و گوشه دار و بدون کرک و دارای برگهای فوقانی ۳-۴ فراهم خطی - سزنيزه ای و برگهای تحتانی متناوب است به طول ۹-۱۳ و عرض ۲-۵/۱ سانتیمتر و در زیر برگ ۲-۳ گل است و باریک و هلالی شکل و بدون کرک است و گلپوش ۱۰/۵ میلیمتر طولش و به شکل لوله‌ای است و در قسمت میانی منقبض نشده است و دندانه گلپوش در راس کرکدار و میله پرچم ۱-۵ میلیمتر طول دارد و غده‌ای و میوه سته ۸-۱۲ میلیمتر قطر دارد و قرمز رنگ است.

ب: نتایج میکرومورفوژی دانه گرده جنس *Polygonatum* در مطالعه گرده‌شناسی گونه‌های جنس *Polygonatum* که طبق جدول ۲ بوسیله میکروسکوپ الکترونی SEM انجام شدتمام گونه‌ها

جدول ۱: لیست نمونه‌های بررسی شده و محل جمع آوری آنها


Table1: List of examples examined and where they were

Taxa	Mحل جمع آوری، جمع آوری کننده و شماره هریاریومی
<i>P.glaberrimum</i>	مازندران: نور، چمستان، ۳۱۰-۱۸۰۰ متر، مظفریان ۷۲۸۴۲
<i>P.orientale</i>	گیلان: جاده اسلام به خلخال، ۸۰۰ متر، حمدی و فرجی ۵۹۰۶
<i>P.sewerzowii</i>	کلستان: جنگل المه، ۱۶۷۰ متر، ثابتی ۵۶۴۵

جدول ۲: اطلاعات مربوط به میکرومورفولوژی گرده ۳ گونه جنس *Polygonatum*

Table 2: Information on pollen micro-morphology 3 species *Polygonatum*

نام گونه	P	E	P/E	Fossula	Size porate
<i>P. glaberrimum</i>	56/70	24/28	2/33	دارد	0/27
<i>P. orientale</i>	47/59	21/46	2/21	دارد	0/23
<i>P. sewerzowii</i>	54/81	24/37	2/24	ندارد	0/19



شکل ۱: تصویر میکروسکوب الکترونی نگاره

Fig 1: Image of Electron Microscope

A1: *P. glaberrimum* نمای استوایی گرده با بزرگنمایی $2.00 \mu\text{m}$, A2: تزیینات سطح دانه گرده با بزرگنمایی $7.50 \mu\text{m}$, B1: *P. orientale* نمای استوایی گرده با بزرگنمایی $2.00 \mu\text{m}$, B2: تزیینات سطح دانه گرده با بزرگنمایی $7.50 \mu\text{m}$, C1: *P. sewerzowii* نمای استوایی گرده با بزرگنمایی $2.00 \mu\text{m}$, C2: تزیینات سطح دانه گرده با بزرگنمایی $7.50 \mu\text{m}$

تک لپایها دانه های گردها شان تک شیاری است و با نتایج (Penet, 2005) که در کlad Asparagales بیشتر خانواده ها تولید گرده تک شیاری می کنند، مطابق است. در رابطه با تزیین گرده تا حدودی می توان تفاوت بین گونه را شناخت. همه گونه ها با گردهای

میکرومورفولوژی دانه گرده: در این بررسی دانه گرده ۳ گونه از جنس *Polygonatum* در ایران توسط میکروسکوب الکترونی SEM مورد بررسی قرار گرفت که دانه های هر سه گونه تک شیار بودند که مطابق با نتایج (Furness, 2000) که به طور کلی

می‌رسد که این ۳ گونه می‌توانند متراffد یکدیگر باشد، در صورتی که بررسی‌های میکرومورفولوژی مرز دقیقی برای جداسازی گونه‌ها ارائه داد که با مطالعات (Deng, 2007) همسو است.

منابع

- ۱- مبین، ص. ۱۳۶۴. رستنی‌های ایران. دانشگاه تهران، جلد ۱. صفحه ۱۹۷.
- 2- Chase, M. W., De Bruijn, A. Y., Cox, A. V., Reeves, C., Rudall, P. J., Johnson, M. A. T. and Eguiarte, L. E. 2000. Phylogenetics of Asphodelaceae (Asparagales): an analysis of plastid rbcL and trnL-FDNA sequences. Ann. Bot. 86, 935–951.
- 3- Chase, M. W., Stevenson, D. W., Wilkin, P. and Rudall, P. J. 1995b. Monocot systematics: a combined analysis. In: Rudall, P.J., Cribb, P.J., Cutler, D.F., Humphries, C. J. (Eds.), Monocotyledons: Systematics and Evolution. Royal Botanic Garden, Kew, pp.685–730
- 4- Chase, M.W., Reveal, J. L. and Fay, M. F. 2009. "A subfamilial classification for the expanded asparagalean families Amaryllidaceae, Asparagaceae and Xanthorrhoeaceae", *Botanical Journal of the Linnean Society* 161 (2): 132–136.
- 5- Chen, B. X. 2013. Pollen morphology and ontogeny of *Maianthemum bifolium*(L.) Plant Syst Evol 299:123–129.
- 6- Chen, X. Q. and Tamura, M. N .2000. *Polygonatum* Mill. Flora of China, vol 24: 223–232.
- 7- Dahlgren, R. M. T., Clifford, H. T. and Yeo, P. F. 1985. The Families of the Monocotyledons. Springer-Verlag, Berlin. pp. 520.
- 8- Davis, P. H. 1984 . *Polygonatum* Miller .Flora of turkey Vol8:68,81-84.
- 9- Deng, X. Y., Zhou, S. D. and He, X. J. 2007. Pollen morphology of 13 Chinese species of *Polygonatum* and its systematic significations. *Wuhan Botanical Research* 25(1):11–18.
- 10- Furness, C. A. and Rudall, P. J. 2000b. Aperture absence in pollen of monocotyledons. In: Harley MM, Morton CM, Blackmore S (eds) Pollen and spores: morphology and biology. Royal Botanical Gardens, Kew.
- با اندازه متوسط که ناجور قطبی و تک شیاری و شکل گرده بیضوی و تریین اگزین سوراخ دار است. و *P. glabrrimum* و *P. sewerzowii* مشاهده شد که در ۲ گونه *Fossula orientale* دارای ساختار *sewerzowii* فاقد این ساختار می‌باشد که نشان دهنده شباهت دو گونه نامبرده بالاست مطالعات انجام شده در ساختار بررسی شده در دانه گرده گونه‌های *Polygonatum* در ایران با مطالعات روی *Polygonatum* مورفوژی دانه گرده که ۱۳ گونه از (Deng, 2007) مورد بررسی قرار داد، مطابقت نداشت. زیرا که دانه‌های گرده‌ها با اشکال و ترتیبات مختلف مشاهده شدند. بررسی‌های دیگر که در سطح جنس‌های خانواده Asparagaceae انجامید نمایان گرایین است که دانه گرده‌ی گونه‌های *Clara gracilis* در ایران با دانه گرده *Polygonatum* که توسط Lopes, 2013 مطالعه شد، مطابقت دارد. دانه گرده *Asparagus* (Ozler, 2007) و دانه گرده (Yildirim, 2013) *Scilla* و دانه گرده (Tekin, 2013) *Hyacinthella* و دانه گرده (Chen, 2013) *Maianthemum bifolium* گرده دارای اشکال بیضوی و تک شیار است ولی از نظر ترتیبات اگزین با جنس *Polygonatum* مطابقت نداشت، زیرا که ترتیبات سطح اگزین در این گونه‌ها به صورت مشبك بوده است. بررسی‌های مورفوژیک گونه‌های *P. glabrrimum* و *P. sewerzowii* نشان دهنده اشتراکاتی در صفات فیلوتاکسی برگ، شکل برگ و داشتن دمبرگ، دارا بودن کرک در سطح زیرین برگ و است که با توجه به صفات کیفی و کمی بررسی شده شباهت بسیار نزدیکی را نشان می‌دهند به نظر

- 19- Penet, L., Nadot, S., Ressayre, A., Forchioni, A., Dreyer, L. and Gouyon, P. H. 2005. Multiple developmental pathways leading to a single morph: monosulcate pollen (Examples from the Asparagales). *Ann Bot. Press*, London. 95:331–343.
- 20- Rechinger, K. H. 1990. Liliaceae. *Flora Iranica*. V 165: 3,175-182 Akad.Druck-u.Verlagsanstalt,Graz.
- 21- Rudall, P. J., Conran, J. G. and Chase, M.W. 2000. Systematics of Ruscaceae (formerly Convallariaceae sensu lato): a combined morphological and molecular investigation. *Bot. J. Linn. Soc.* 134, 73–92.
- 22- Tamura, M. N. 1993. Biosystematic studies on the genus *Polygonatum* (Liliaceae) III. Morphology of staminal filaments and karyology of eleven Eurasian species. *Botanische Jahrbücher für Systematik* 115.
- 23- Tekin, M. 2013. Morphological and anatomical investigations on endemic *Hyacinthella acutiloba* in Turkey Research article/Araştırma makalesi. 6/1 161-168.
- 24- Yu-Ping, L., Katsuko, K. and Tsuneo, N. 1993. Pharmacognostical Studies on the *Polygonatum* Plants (Part III): On the Anatomical Characteristics of the *Polygonatum* Rhizomes from China [in Japanese]. *The Japanese journal of pharmacognosy*, 47(2): 144-155.
- 25- Zweigelt, F. 1913. Vergleichende Anatomie der Asparagoideae, Ophiopogonoideae, Aletroideae, Luzuriagoideae und Smilacoideae nebst Bemerkungen über die Beziehungen Ophiopogonoideae und Dracaenoideae. Denkschriftl aus der Akademie dc.
- 11- Jinhua, L., Shoubiao, Z., Chunjing, W. and Benqi, Y. 2005. Comparative anatomy of the leaves in {sl *Polygonatum*} from Anhui Province. *Acta Botanica Yunnanica*, 27(5):509-516.
- 12- Jin-Hua, L., Shou-Biao, Z., Wang, Y and Chang-Cheng, T. 2007. Leaf comparative anatomy of *Polygonatum cyrtonema* from five populations. *Guiaia* 27 (6):826-831.
- 13- Kim, D. K. 2012. The Phylogenetic Relationships of Asparagales in Korea Based on Five Plastid DNA Regions. *J. Plant Biol.* 55:325-341.
- 14- Lopes, R. C. 2012. Pollen morphology and wall structure of Neotropical species of *Herreria* and *Clara* (Asparagaceae-Agavoideae) and its taxonomic implications. *Plant Syst Evol* 299:25–34.
- 15- Melchior, H. 1964. A. Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien, 12th edition, Volume 2. Angiospermen. Borntraeger, Berlin.
- 16- Miller, P. 1754. The abridgement of Gardener's Dictionary of 1754. *Bot. Exch. Club & Soc. Brit. Isles Rept.* 3: 426-436.
- 17- Öztürk, D. and Koyuncu, O. 2014. Comparative anatomical studies on twelve *Ornithogalum* (Asparagaceae) species (eleven non-endemic, one endemic) belonging to subgen. *Ornithogalum* and subgen. *Beryllis*, growing naturally in Eskişehir (Central Anatolia-Turkey) Journal of Scientific Research and Reviews Vol. 3(3), pp. 040 – 049.
- 18- Parsa, A. 1950. Flore de l'Iran Vol.5, Ministere de l'education:museum d'histoire naturelle de Teheran Pp.:371-372.